

美濃加茂市 乳幼児期予防接種スケジュール

R6年4月～

ワクチンの種類		接種回数	種類	乳児期					幼児期							学童期/思春期							
				2か月	3か月	4か月	5か月	6-8か月	9-11か月		12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
インフルエンザ菌b型(ヒブ) 7歳半前日まで		4回	不活化	①	②	③ (1歳までに3回受ける)					④追加 (③から7か月以上)												
四種混合 (百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオ) 7歳半前日まで		4回	不活化	①	②	③ (1歳までに3回受ける)					④ 追加 (③から1年～1年半後)										二種混合 (11歳～13歳前日まで)		
※ヒブワクチンと四種混合ワクチン、もしくは五種混合ワクチンを選択する。																							
※令和6年4月1日～ 五種混合 (百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブ) 7歳半前日まで		4回	不活化	①	②	③ (1歳までに3回受ける)					④ 追加 (③から1年～1年半後)										二種混合 (11歳～13歳前日まで)		
肺炎球菌(PCV15) 5歳前日まで		4回	不活化	①	②	③ (1歳までに3回受ける)					④追加 (③から60日後かつ1歳以降)												
B型肝炎 1歳前日まで		3回	不活化	①	②		③ (①から139日以上空ける)																
ロタウイルス	1価	2回	生	①	②		※①－②は4週間以上空けて2回(生後24週まで)							※①は14週6日までに接種開始									
	5価	3回		①	②	③	※①－②－③は4週間以上空けて3回(生後32週まで)																
BCG 1歳前日まで		1回	生				①			※5か月～8か月での接種が望ましい													
麻しん風しん(MR) 1歳と年長で接種		2回	生								① 第1期 (2歳前日まで)					② 年長							
水痘 3歳前日まで		2回	生								①	② (3歳前日まで)			※①－②は6か月以上空ける								
日本脳炎		4回	不活化		※①②③(第1期)は3歳～7歳半まで ※②－③はおおむね1年空ける								① ②	③				④第2期 (9歳～13歳前日まで)					
ヒトパピローマウイルス (HPV)	2価	3回	不活化	※①－②は1か月、①－③は6か月空ける							12歳～16歳女子 (小学校6年生～高校1年生相当)							①②③					
	4価			※①－②は2か月、①－③は6か月空ける																			
	9価	2回		※①－②は、6か月以上空ける							小学校6年生(12歳)～15歳未満女子							①②					
		3回		※①－②は2か月、①－③は6か月空ける							15歳以上～16歳(高校1年生相当)女子							①②③					